

Dlouhodobá prognoza výskytu chorob révy vinné od 15.6. do 10.7. 2008.

Peronospora

Podnormální (žádné) srážky během měsíce dubna a počátkem května znamenají, že nebyly vytvořeny „předpoklady“ pro hospodářsky významný výskyt choroby. Taktéž i malé srážky v 23. a 24. týdnu a pokles teplot tlumí rozvoj choroby.

Pro další postřik doporučuji použít Folpan 80 WG a to v dávce 0,2 kg/ 100 lt. Záměrně uvádím koncentraci na 100 lt postřiku, to postačuje. Další ochranu nám zabezpečí přípravky použité na padlí.

Padlí (oidium)

Již jsem upozoroval nejen prvotní, ale i kalamitní nákazu (MP Hantále). **Následující 2 postřiky budou rozhodující pro rozvoj padlí.** Na postřik těsně po odkvětu doporučuji použít Falcon 460 EC v dávce 0,04 lt/ 500 keřů révy a min. 50 lt vody. Postřik provést z obou stran. Za 10 až 14 dnů, dle vývoje počasí a tlaku choroby, provést další postřik a to Discus v dávce 0,02 kg/ 500 keřů/50 lt. Vzhledem k tomu, že jsem doporučoval již před květem 2 krát Ridomil Gold, který též obsahuje účinnou látku folpet jako Folpan, proto musíme přerušit řadu folpetu. Nepoužívat tedy Quadris Max, ani Cabrio Top.

Discus nám zajistí ochranu jak proti padlí, peronospoře, tak i botrytidě v dalším období.

Plísen šedá (botrytida)

Ochranu zabezpečí Folpan a následující Discus.

Zpracoval: ing. Dalibor Vojtěšek